

## PESCHE GIALLE

### Varietà consigliate per l'Emilia Romagna

Cultivar	Gusto dolce	Maturazione (gg. da Redhaven)
<b>Rich May*</b>		-33
Maycrest® (Ministar*)		-29
Springcrest		-24
Springbelle		-21
<b>Zee Diamond</b>		-20
<b>Crimson Lady*</b>		-19
<b>Ruby Rich® (Zainoar*)</b>		-13
<b>Coraline® (Monco*)</b>		-12
Royal Gem® (Zairegem*)		-12
Alix*		-11
Royal Glory® (Zaifer*)		-5
Early Rich® Zairiala*		-3
Azurite® Monnoir*		-3
Flavorcrest		-3
Redhaven		0
Rich Lady*		+2
<b>Vista Rich® Zainobe*</b>		+3
Red Moon*		+4
Summer Rich*		+8
Diamond Princess*		+9
Doris*		+9
Maria Marta*		+10
<b>Grenat® Monafi*</b>	●	+14
Romestar*		+17
Elegant Lady® (Dama del Mar*)		+18
Suncrest		+19
Symphonie*		+20
<b>Zee Lady*</b>		+20
Fayette		+32
Summer Lady® Zaijula*		+33
Nadia		+38
<b>Kaweah® Zainory*</b>		+41
<b>Plusplus® Maillarplus*</b>		+45
<b>Red Star*</b>		+52

Fonte: Disciplinary di produzione integrata, Regione Emilia-Romagna.

In grassetto sono evidenziate le varietà più interessanti, che vengono descritte dettagliatamente nelle schede seguenti.

### Rich May\*

-33 giorni da Redhaven



Costituita da Zaiger (USA) da origine non nota.

**L'albero** Portamento assurgente (tipo Rich), vigoria elevata, epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: incostante.

**Il frutto** Forma rotonda, talora oblunga; cavità peduncolare mediamente stretta e poco profonda; epidermide gialla, poco tomentosa, mazzata, con sovraccolore rosso brillante esteso sul 90-100% della superficie; polpa gialla, arrossata a maturità, semiaderente, di buona consistenza (anche se manifesta una certa tendenza a sovramaturare all'apice); nocciolo di medie dimensioni.

Calibro: A-AA.

#### Caratteristiche qualitative del frutto

Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm <sup>2</sup> )	4,6
R.S.R. (°Brix)	10
Acidità (ml NaOH N/10)	15,6

## Zee Diamond\*

-20 giorni da Redhaven



Costituita da Zaiger (USA) da origine non nota.

**L'albero** Portamento assurgente (non Rich), vigoria elevata, epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: incostante.

**Il frutto** Forma rotonda, tendenzialmente regolare simmetrica, con sutura in genere poco marcata, apice calicino leggermente incavato; cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide giallo aranciato sovraccolorata di rosso brillante leggermente mazzato esteso sul 90-100% della superficie; polpa gialla, mediamente arrossata, di colore giallo verdastro in prossimità del nocciolo, aderente, di elevata consistenza, mediamente succosa, tendenzialmente acida, mediamente profumata; nocciolo di medie dimensioni. Calibro: A.

### Caratteristiche qualitative del frutto

Sapore	acido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,7
R.S.R. (°Brix)	9,8
Acidità (ml NaOH N/10)	14,8

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** forma dei frutti; estensione brillantezza del sovraccolore; consistenza della polpa.

**Punti deboli:** produttività incostante; pezzatura e intensità del sovraccolore sui rami interni e/o di scarsa qualità.

## Crimson Lady\*

-19 giorni da Redhaven



Costituita da Bradford (USA) da incrocio Red Diamond x Springcrest.

**L'albero** Portamento espanso, vigoria media, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: incostante.

**Il frutto** Forma rotondo-obolata, regolare e simmetrica; epidermide gialla sovraccolorata di rosso esteso sul 70-90% della superficie; polpa di colore da giallo, giallo verdastro in prossimità del nocciolo, aderente, di elevata consistenza (quasi da percoca), di discreta succosità, di sapore medio con evoluzione non tradizionale in post raccolta; nocciolo medio-piccolo. Calibro: A-AA.

### Caratteristiche qualitative del frutto

Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,2
R.S.R. (°Brix)	11,6
Acidità (ml NaOH N/10)	12,9

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** forma dei frutti, intensità ed estensione del sovraccolore, consistenza della polpa.

**Punti deboli:** produttività incostante, pezzatura sui rami di scarsa qualità o interni, sapore, succosità ed evoluzione non tradizionale della polpa (tipo percoca) per raccolte anticipate.

## Ruby Rich® Zainor\*

-13 giorni da Redhaven



Costituita da Zaiger (USA) da origine non nota.

**L'albero** Portamento assurgente (tipo Rich), vigoria elevata, epoca di fioritura medio-precoce e fiore rosaceo. Produttività: incostante.

**Il frutto** Forma rotonda, regolare, con presenza di umbone e cavità peduncolare profonda; epidermide di colore giallo arancio, poco tomentosa, con sovraccolore rosso uniforme, mazzato ed esteso sul 90-100% della superficie; polpa gialla, venata di rosso per metà del frutto nello strato sottoepidermico, aderente, di buona consistenza anche se non omogenea; nocciolo di medie dimensioni.

Calibro: A-AA.

### Caratteristiche qualitative del frutto

Sapore	acido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,7
R.S.R. (°Brix)	11,1
Acidità (ml NaOH N/10)	13,6

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** sovraccolore esteso e intenso, non cupo; pezzatura e forma dei frutti (su rami misti di qualità e per raccolte non anticipate).

**Punti deboli:** produttività incostante; comportamento vegeto produttivo di tipo Rich; sapore per raccolte anticipate; consistenza

non omogenea della polpa.

## Coraline® Monco\*

-12 giorni da Redhaven



Costituita da Monteaux-Calliet (Francia) da origine non nota.

**L'albero** Portamento assurgente (tipo Rich), vigoria media, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: media.

**Il frutto** Forma rotondo-obolata, regolare e simmetrica, con linea di sutura superficiale, apice depresso e cavità peduncolare larga e mediamente profonda; epidermide da giallo arancio a giallo verde, poco tomentosa, con sovraccolore rosso uniforme, leggermente mazzato, esteso sul 90-100% della superficie; polpa gialla, arrossata per metà del frutto nello strato sottoepidermico, aderente, di consistenza elevata anche se non omogenea (maggiore al nocciolo); nocciolo di media randezza.

Calibro: A-AA.

### Caratteristiche qualitative del frutto

Sapore	acido
Durezza (kg/0,5 cm2)	4,6
R.S.R. (°Brix)	11,2
Acidità (ml NaOH N/10)	15,5

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** sovraccolore esteso e intenso, non cupo; pezzatura, forma e sapore dei frutti su rami misti di qualità e per raccolte non anticipate).

**Punti deboli:** produttività incostante; comportamento vegeto produttivo di tipo Rich; sapore per raccolte anticipate; consistenza non omogenea della polpa.

## Early Rich® Zairiala\*

-3 giorni da Redhaven



Costituita da Zaiger (USA) da libera impollinazione di Rich Lady.

**L'albero** Portamento assurgente (tipo Rich), vigoria medio-elevata, epoca di fioritura precoce fiore rosaceo. Produttività: incostante.

**Il frutto** Forma oblata, tendenzialmente simmetrica triangolare, con apice incavato, cavità peduncolare profonda e mediamente larga, linea di sutura mediamente marcata; epidermide di colore giallo, poco tomentosa, con sovraccolore rosso intenso, non cupo, mazzato ed esteso sul 90-100% della superficie; polpa gialla, venata di rosso per metà del frutto nello strato ottoepidermico, semispicca (spicca completa maturazione), di buona consistenza, di sapore medio,

nocciolo di medie dimensioni.

Calibro: A-AA.

### Caratteristiche qualitative del frutto

<b>Sapore</b>	acido
<b>Durezza (kg/0,5 cm2)</b>	4,2
<b>R.S.R. (°Brix)</b>	10,5
<b>Acidità (ml NaOH N/10)</b>	13,5

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** sovraccolore esteso ed intenso, non cupo; pezzatura; consistenza della polpa.

**Punti deboli:** produttività; comportamento vegeto produttivo di tipo Rich; forma dei frutti (triangolare) e sapore (su rami deboli o per raccolte anticipate).

## Azurite® Monnoir\*

-3 giorni da Redhaven



Costituita da Monteaux-Calliet (Francia) da origine non nota.

**L'albero** Portamento assurgente, vigoria medio-elevata, epoca di fioritura precoce e fiore rosaceo. Produttività: medio-elevata.

**Il frutto** Forma rotondo-oblata, regolare e simmetrica, con linea di sutura poco marcata, apice incavato e cavità peduncolare mediamente profonda; epidermide gialla, poco tomentosa, con sovraccolore rosso uniforme, leggermente mazzato, esteso sul 90-100% della superficie; polpa gialla, leggermente arrossata per metà del frutto nello strato sottoepidermico a maturazione, aderente, di consistenza elevata, di fine tessitura, di discreta succosità e di buon sapore,

leggermente acidulo; nocciolo di media grandezza.

Calibro: A-AA.

**Caratteristiche qualitative del frutto** Sapore leggermente acidulo.

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** forma dei frutti, regolare simmetrica; estensione e intensità del sovraccolore; pezzatura (sui rami misti di buona qualità); consistenza della polpa; sapore (acidulo).

**Punti deboli:** sapore e succosità della polpa per raccolte anticipate.

*Nota: prime osservazioni.*

## Vista Rich® Zainobe\*

+3 giorni da Redhaven



Costituita da Zaiger (USA) da origine non nota.

**L'albero** Portamento mediamente assurgente (tipo Rich), vigoria media, epoca di fioritura medioprecoce e fiore rosaceo. Produttività: media.

**Il frutto** Forma rotondo-oblata, leggermente asimmetrica e triangolare; cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide giallo arancio, poco tomentosa, con sovraccolore da rosso scuro a rosso medio, esteso sul 90-100% della superficie; polpa gialla, spicca, di buona consistenza e di buon sapore; nocciolo di medie dimensioni.

Calibro: A-AA.

### Caratteristiche qualitative del frutto

<b>Sapore</b>	acido
<b>Durezza (kg/0,5 cm2)</b>	4,64
<b>R.S.R. (°Brix)</b>	11,8
<b>Acidità (ml NaOH N/10)</b>	15,9

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** pezzatura; estensione e intensità del sovraccolore; consistenza della polpa.

**Punti deboli:** produttività incostante; comportamento vegeto-produttivo di tipo Rich; forma dei frutti (tendenzialmente triangolari), specie su rami di scarsa qualità.

## Grenat® Monafi\*

+14 giorni da Redhaven



Costituita da Monteaux-Calliet (Francia) da origine non nota.

**L'albero** Portamento assurgente, vigoria medio-elevata, epoca di fioritura tardiva e fiore rosaceo. Produttività: elevata.

**Il frutto** Forma rotondo-oblata, tendenzialmente regolare, talora leggermente asimmetrica e triangolare, con linea di sutura superficiale, apice leggermente depresso con presenza di piccolo umbone e cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide gialla, poco tomentosa, sovraccolore di rosso da intenso a medio non brillante sull'80-90% della superficie; polpa gialla, non venata di rosso, semispicca, di elevata consistenza, di sapore dolce, non particolarmente succosa; nocciolo di

dimensioni medie.

Calibro: A-AA.

### Caratteristiche qualitative del frutto

<b>Sapore</b>	subacido
<b>Durezza (kg/0,5 cm2)</b>	5,1
<b>R.S.R. (°Brix)</b>	13,5
<b>Acidità (ml NaOH N/10)</b>	4,2

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** produttività; pezzatura dei frutti; estensione e intensità del sovraccolore; consistenza e tenuta della polpa.

**Punti deboli:** forma dei frutti, talora asimmetrica e triangolare, specie sui rami deboli o per raccolte anticipate; sapore (cv. subacida) per raccolte anticipate o concentrate; succosità della polpa.

## Zee Lady\*

+20 giorni da Redhaven



Costituita da Zaiger (USA) da incrocio O'Hery x June Lady.

**L'albero** Portamento regolare-espanso, vigoria media, epoca di fioritura intermedia e fiore campanulaceo. Produttività: media.

**Il frutto** Forma rotonda, tendenzialmente simmetrica e regolare, con linea di sutura poco marcata, apice incavato e cavità peduncolare larga e mediamente profonda; epidermide di colore giallo, sovraccolorata di rosso intenso mazzato sull'80-90% della superficie; polpa gialla, arrossata al nocciolo, spicca (staccata con presenza di callo), di buona consistenza e discreta tenuta, di buon sapore; nocciolo di medie dimensioni. Calibro: A-AA.

### Caratteristiche qualitative del frutto

Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm <sup>2</sup> )	5,9
R.S.R. (°Brix)	11,2
Acidità (ml NaOH N/10)	13,7

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** forma dei frutti; estensione del sovraccolore; sapore e consistenza della polpa; scarsa sensibilità a batteriosi e a monilia.

**Punti deboli:** produttività media; pezzatura dei frutti sui rami misti deboli; intensità del sovraccolore in mancanza di accurato diradamento e di potatura verde; polpa staccata con presenza di callo.

## Keweah® Zainory\*

+41 giorni da Redhaven



Costituita da Zaiger (USA) da origine non nota.

**L'albero** Portamento regolare-espanso, vigoria media, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: elevata.

**Il frutto** Forma tendenzialmente rotonda e simmetrica, talora triangolare, con apice depresso, sutura superficiale e cavità peduncolare profonda; epidermide giallo arancio, sovraccolorata di rosso luminoso da intenso a medio esteso sul 70-90% della superficie; polpa gialla, venata di rosso al nocciolo, spicca (staccata con callo), di elevata consistenza, di buon sapore; nocciolo di piccole dimensioni. Calibro: A.

### Caratteristiche qualitative del frutto

Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm <sup>2</sup> )	5,6
R.S.R. (°Brix)	12,4
Acidità (ml NaOH N/10)	14,4

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** produttività; estensione e brillantezza del sovraccolore; consistenza succosità e sapore della polpa.

**Punti deboli:** pezzatura e forma dei frutti per raccolte anticipate o diradamento non corretto sui rami deboli; intensità del sovraccolore su frutti interni; polpa staccata con presenza di callo; sensibilità a monilia.

## Plusplus® Maillarplus\*

+45 giorni da Redhaven



Costituita da A. Maillard (Francia) da origine non nota.

**L'albero** Portamento assurgente, vigoria elevata, epoca di fioritura intermedia e fiore rosaceo. Produttività: medio-elevata.

**Il frutto** Forma rotondo-oblat, tendenzialmente asimmetrica e talora triangolare, con apice depresso, sutura superficiale e cavità peduncolare stretta e profonda; epidermide gialla, sovraccolorata di rosso da intenso a medio, leggermente mazzato, esteso sul 70-90% della superficie; polpa gialla, venata di rosso al nocciolo, spicca (staccata con callo), di elevata consistenza, di buon sapore; nocciolo di dimensioni medio piccole. Calibro: A-AA.

### Caratteristiche qualitative del frutto

Sapore	equilibrato
Durezza (kg/0,5 cm <sup>2</sup> )	5,4
R.S.R. (°Brix)	11,7
Acidità (ml NaOH N/10)	13,8

### Giudizio complessivo

**Aspetti positivi:** produttività; estensione e brillantezza del sovraccolore; consistenza succosità e sapore della polpa.

**Punti deboli:** pezzatura e forma dei frutti (tendenzialmente triangolari e asimmetrici); callo al nocciolo.